

Waarom een kroon?



Kroon

Een royale renovatie

Een tand of een kies bestaat uit twee onderdelen; een wortelgedeelte, waarin het wortelkanaal met de zenuwvezels en kleine bloedvaten zich bevinden en het zichtbare gedeelte, wat het kroongedeelte wordt genoemd.

Als het kroongedeelte beschadigd is moet dit hersteld worden om beschadiging en pijnklachten aan de wortelkanalen te voorkomen. Beschadigingen kunnen door meerdere oorzaken ontstaan; een breuk na een trauma, een te groot gat ontstaan door tandbederf of het geheel ontbreken van een tand.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De beschadigde tand of kies wordt beslepen tot een stomp. De tandarts maakt vervolgens een afdruk welke opgestuurd wordt naar het tandtechnisch laboratorium voor de vervaardiging van de kroon.

Ondertussen krijgt u een tijdelijke kroon, ook wel noodkroon genoemd. De noodkroon wordt vastgezet met tijdelijk cement en is daardoor minder belastbaar dan de uiteindelijke kroon. Houd hier rekening mee als u stevig kauwt, of tijdens het nuttigen van





'plakkerig' eten. Het voordeel van dit tijdelijk cement is dat voor de plaatsing van de definitieve kroon de noodkroon makkelijk verwijderd kan worden. Na het plaatsen van de definitieve kroon, circa twee weken later, kan het zijn dat u nog enige tijd last heeft van betreffende kroon tijdens het kauwen. Dit is normaal. Door de behandeling zijn de zenuwen geïrriteerd en kunnen ze enige tijd nodig hebben om te herstellen.

Na de behandeling moet u de tanden en kiezen goed op elkaar kunnen sluiten. Na het plaatsen van de kroon zal de tandarts dit bij u testen. Het komt het wel eens voor dat, door de eventuele verdoving, u het niet goed aanvoelt. Indien u een verhoging voelt is het raadzaam om nog even terug te gaan naar de tandarts om de kroon nog te laten beslijpen.



Praktijkstempel: